

PIÈGE MOUCHE DE LA CERISE




La mouche de la cerise est un petit insecte de 5 mm. Son corps noir est tacheté de jaune et ses ailes sont rayées de bleu-noir. Attirée par la couleur jaune des cerises mûrissantes, elle introduit son œuf au cœur du fruit. Une larve blanchâtre éclot au bout d'une semaine : elle se nourrit de la chair du fruit et provoque des dégâts qui compromettent la consommation de vos cerises (le fruit noircit et tombe de l'arbre). Le piège Solabiol permet de contrôler la présence de la mouche de la cerise dans vos arbres fruitiers. Il ne contient pas de pesticide et fonctionne grâce à un attractant alimentaire.

Les attractants alimentaires permettent de reproduire les substances sécrétées par la plante hôte afin d'attirer l'insecte cible. Son utilisation attire et piège aussi bien les mâles que les femelles adultes du ravageur, qui viennent se coller au piège Delta. Il s'agit de solutions efficaces de lutte biologique, respectueuses de la faune et de la flore, sans impact sur les pollinisateurs. L'attractif alimentaire permet un suivi pour un mois.

MODE D'EMPLOI

- 1 Monter le piège Delta jaune en emboitant les deux volets.
- 2 Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans les 2 seringues (par simple pression sur le piston) dans la coupelle.
- 3 Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant l'attractant alimentaire va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel la phéromone commencera à diffuser.
- 4 Suspendre le piège Delta dans les branches de l'arbres fruitiers.
- 5 Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en attractants tous les 30 jours. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 5 m autour du piège.

Contrôler le piège une fois par semaine. Surveiller le nombre de mouches de la cerise qu'il contient. Vous pourrez renforcer la protection de vos arbres à l'aide d'un traitement.



PÉRIODE D'EMPLOI

J F M A M J J A S O N D

Optimum Déconseillé

Le vol de la mouche de la cerise a lieu de la mi-mai à début juillet. Mettez le piège en place lorsque vos cerises commencent à mûrir.

Pour correctement cibler le nuisible, ne placez pas les pièges plus tôt que prévu et retirez-les après la récolte.

Veillez à cueillir la totalité des fruits à temps et à supprimer les fruits abîmés pour minimiser les attaques de la mouche. L'attractant alimentaire n'est pas fait pour être utilisé plusieurs années. Utilisez ce piège pour la saison de l'année en cours.

Attractants alimentaires

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains après manipulation. Conserver dans son emballage d'origine et respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés.

En cas d'urgence, appeler pour la France le 15/112 ou le centre antipoison. Pour la Belgique +32 (0)70245245.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Tenir hors de portée des enfants. Réemploi de la seringue interdit.

Numéro de lot / date de fabrication : voir sur l'emballage.

Cette boîte contient : 1 piège Delta et 4 seringues d'attractants alimentaires.

Composition : formulation en gel.

Ces seringues se conservent à température ambiante 30 mois après la date de fabrication mentionnée sur l'emballage.

KERSENVLEIEGVAL




De kersenvlieg is een klein insect van 5 mm met een zwart lichaam met gele vlekken en blauwzwart gestreepte vleugels. Aange trokken door de gele kleur van rijpende kersen, brengt ze haar ei in het hart van de vrucht. Een witachtige larve komt na een week uit: deze voedt zich met het vruchtvlees en veroorzaakt schade aan de kersen (de vrucht wordt zwart en valt van de boom). De Solabiol-val helpt de populaties kersenvliegen in uw fruitbomen onder controle te houden. Het bevat geen pesticiden en werkt dankzij een voedsellokstof. Voedsellokstoffen maken het mogelijk om de stoffen die door de waardplant worden uitgescheiden te reproduceren om het doelinsect aan te trekken. Het gebruik ervan trekt zowel mannetjes als de volwassen vrouwtjes aan en vangt deze op de lijmplaat. De Solabiol val is een effectief middel om in de biologische bestrijding te integreren, met respect voor de natuur, zonder impact op bestuivers. De voedsellokstof laat een follow-up van een maand toe.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Monteer de gele Delta-val door de twee flappen aan elkaar te koppelen.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende plaat en plaats de beker in het midden. Vul vervolgens de beker met gel van 2 spuitjes.
- 3 Plaats de plakplaat in de val. De gel met de voedsellokstof zal uitdrogen en wasachtig worden, waarna het feromoon begint te werken.
- 4 Hang de Deltaval in de takken van de fruitboom.
- 5 Vernieuw de plakplaat als deze vol insecten zit. Vul om de 30 dagen lokstof bij. Geschat wordt dat het lokstof een bereik heeft van 5 meter rond de val.

Controleer de val eenmaal per week. Let op het aantal kersenvliegjes die gevangen zijn. Een behandeling, met een product die hiervoor is toegelaten, is aan te raden om uw bomen te beschermen.



GEBRUIKSPERIODE

J F M A M J J A S O N D

ideaal mogelijk

De kersenvlieg vlucht vindt plaats van half mei tot begin juli. Zet de val wanneer de kersen beginnen te rijpen.

Om de kersenvlieg op de juiste manier te bestrijden, plaatst u de val niet eerder dan gepland en verwijdert u ze na de oogst.

Zorg ervoor dat je al het fruit op tijd wordt geplukt en verwijder beschadigd fruit om aanvallen van vliegen tot een minimum te beperken.

De voedsellokstof is niet gemaakt om gedurende meerdere jaren te worden gebruikt. Gebruik deze val voor het seizoen van het lopende jaar.

Voedsellokkers

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen na hanteren. Bewaar in de originele verpakking en respecteer de vermelde toepassingen, doseringen, voorwaarden en voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Bel in geval van nood Frankrijk 15/112 of het antigifcentrum. Voor België +32 (0)70245245.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK : Buiten bereik van kinderen houden. Spuit niet hergebruiken.

Deze doos bevat: 1 Delta-val en 4 spuitjes. Samenstelling: gelformulering. Deze feromoonspuit is 30 maanden houdbaar bij kamertemperatuur na productiedatum die op de verpakking staat vermeld.

Lotnummer/productiedatum: zie op de verpakking.