

# PIÈGE VER DES POMMES, DES POIRES (DES ABRICOTS ET DES PÊCHES)


Le carpocapse des pommes est un papillon d'environ 18 mm avec ses ailes déployées. Ce sont les chenilles qui se nourrissent des fruits et causent les dégâts : le piègeage des papillons adultes mâles permet de détecter leur présence dans vos vergers. Il ne contient pas de pesticide. Une phéromone est une substance sécrétée par une espèce qui induit un comportement spécifique chez un autre membre de la même espèce. La phéromone sexuelle, utilisée ici, imite les carpocapses femelles pour attirer les mâles et les piéger (ils viennent se coller sur le piège Delta). Cette phéromone est spécifique de l'espèce et n'attire dans le piège que des carpocapses. C'est une solution importante dans la lutte biologique respectueuse de l'environnement, sans impact sur les polliniseurs. Elle permet de déclencher une action contre la prolifération des ravageurs. Les phéromones sont incluses pour 3 mois. Pour couvrir toute la saison, renouveler les phéromones une fois. Ce kit est utilisable sur les arbres fruitiers suivants : cognassiers, noyers, poiriers et pommiers, etc...



## MODE D'EMPLOI

- ① Monter le piège Delta jaune en emboitant les deux volets.
- ② Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue (par simple pression sur le piston) dans la coupelle.
- ③ Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant la phéromone va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel la phéromone commencera à diffuser.
- ④ Suspendez le piège Delta dans les branches de l'arbres fruitiers.
- ⑤ Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en phéromone tous les 2-3 mois. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 10 m autour du piège

Contrôler le piège 1 fois par semaine. En cas de forte présence de carpocapses, traiter vos pruniers 10 jours plus tard à l'aide d'un insecticide.



## PÉRIODE D'EMPLOI

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Optimum						Déconseillé					

La période optimale d'utilisation s'étend du printemps jusqu'à la récolte.

Seringue de phéromones
H412 Nociif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient (8E,10E)-dodeca-8,10-dien-1-ol (N° CAS : 33956-49-9). Peut produire une réaction allergique.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie ou par un organisme agréé conformément à la réglementation nationale.
Premiers soins : En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. En cas de contact avec la peau : laver avec du savon et une grande quantité d'eau. Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Dans tous les cas, si les symptômes persistent ou en cas de malaise, consulter un médecin et lui présenter l'étiquette et/ou la fiche de données de sécurité.
En cas d'urgence, appeler pour la France le 15/112 ou le centre antipoison. Pour la Belgique +32 (0)70245245.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Tenir hors de portée des enfants. A la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi de la seringue interdit.

Cette boîte contient : 1 piège Delta et 1 seringue de phéromones.

**Composition :** formulation gel de 8E, 10E-dodecadienol (N° CAS : 33956-49-9).

Cette seringue à phéromone se conserve à température ambiante 30 mois après la date de fabrication mentionnée sur l'emballage.

**Numéro de lot / date de fabrication :** voir sur l'emballage.

**BE** SBM Life Science SPRL-BVBA  
Regus Brussels Airport - Pegasuslaan 5 - 1831 Diegem  
+32 (0) 2 709 20 75 - [www.solabiol.com/be](http://www.solabiol.com/be)

**FR** Distribué par : SBM Life Science SAS  
60 chemin des Mouilles - 69130 Ecully  
Tél. : 04 37 64 32 00

559337FBNa

**SBM Info Conso** ☎  
0 800 02 03 04 Service à appels gratuits

# FRUITMOTVAL VOOR APPELS, PEREN, (ABRIKOZEN EN PERZIKEN)


De fruitmot is een vlinder van ongeveer 18 mm met uitgestrekte vleugels. Het zijn de rupsen die zich voeden met het fruit en de schade veroorzaken: het vangen van volwassen mannetjesmotten kan hun aanwezigheid in uw boomgaarden detecteren. Het bevat geen pesticiden. Een feromon is een stof die door de ene soort wordt uitgescheiden en die een bepaald gedrag bij een ander lid van dezelfde soort oproept. Het hier gebruikte seksferoomon imiteert vrouwelijke fruitmotten om mannetjes aan te trekken en te vangen (ze blijven vastkleven aan de Delta-val). Dit feromon is soortspecifiek en trekt alleen fruitmotten naar de val. Het is milieuvriendelijke manier van monitoren, zonder impact op bestuivers. Dit helpt, om zo nodig, een bestrijding met een insecticide op het juiste moment uit te voeren. Feromonen zijn inbegrepen voor 3 maanden. Deze set kan worden gebruikt op de volgende fruitbomen: kweeperen, walnoten, peren, appelbomen, enz.



## GEBRUIKSAANWIJZING

- ① Monteer de gele Delta-val door de twee flappen aan elkaar te koppelen
- ② Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende plaat en plaats de beker in het midden. Vul vervolgens de beker met gel uit de sputt.
- ③ Plaats de plakplaat in de val. De gel met het feromon zal uitdrogen en wasachtig worden, waarna het feromon begint te werken
- ④ Hang de Deltaval in de takken van de fruitboom
- ⑤ Vernieuw de plakplaat als deze vol insecten zit. Vul om de 2-3 maanden feromon bij. Geschat wordt dat het feromon een bereik heeft van 10 meter rond de val.

Controleer de val eenmaal per week. Bij een sterke aanwezigheid van fruitmotten, uw fruitbomen 10 dagen later behandelen met een insecticide.



## GEBRUIKSPERIODE

J F M A M J J A S O N D

ideaal mogelijk

De optimale gebruiksperiode loopt van de lente tot de oogst.

### Feromonos�uit

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat (8E,10E)-dodeca-8,10-dien-1-ol (CAS : 33956-49-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P273 Voorkom losing in het milieu. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt in overeenstemming met de nationale regelgeving.

Eerste hulp : Bij oogcontact: Uit voorzorg de ogen spoelen met water. Bij aanraking met de huid: wassen met zeep en veel water. GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Bij aanhoudende klachten of onwel voelen in ieder geval een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatie-blad tonen.

Bel in geval van nood Frankrijk 15/112 of het antigifcentrum.

Voor België +32 (0)70245245.

**VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK :** Buiten bereik van kinderen houden. Aan het einde van het seizoen wordt de val verwijderd, schoongemaakt en opgeslagen voor gebruik in het volgende jaar. Sputt niet hergebruiken.

Deze doos bevat: 1 Delta-val en 1 feromonos�uit.

**Samenstelling:** gelformulering van 8E,10E-dodecadienol (CAS : 33956-49-9).

Deze feromonos�uit is 30 maanden houdbaar bij kamertemperatuur na productiedatum die op de verpakking staat vermeld.  
**Lotnummer/productiedatum:** zie op de verpakking.

**NL** SBM Life Science B.V.  
Vermogenweg 107 - 3641 SR Mijdrecht  
+31 (0) 297 44 30 01 - [www.solabiol.com/nl](http://www.solabiol.com/nl)

**BE** SBM Life Science SPRL-BVBA  
Regus Brussels Airport - Pegasusaan 5 - 1831 Diegem  
+32 (0) 2 709 20 75 - [www.solabiol.com/be](http://www.solabiol.com/be)