

## MODE D'EMPLOI

Agiter énergiquement la bouteille avant utilisation. Remplir le pulvérisateur aux  $\frac{3}{4}$  d'eau. Verser dans l'eau le volume de produit nécessaire. Terminer le remplissage d'eau. Agiter. Pulvériser le végétal uniformément.



Sans déboucher, incliner légèrement la bouteille, pour obtenir le dosage voulu à l'aide des graduations rondes.



Ajuster le dosage si nécessaire en inclinant la bouteille dans l'autre sens.



Redresser la bouteille et appuyer sur le bouchon sécurité enfant pour le dévisser.



Verser la quantité pré-dosée dans le pulvérisateur, sans presser la bouteille. Bien refermer après usage.

## PÉRIODE D'EMPLOI

✓ IDÉAL

● POSSIBLE

J F M A M J J A S O N D

**INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES** - Nom homologué : LIMOCIDE® J N° AMM : 2200059 - Emploi autorisé dans les jardins. Détenteur de l'AMM : VIVAGRO SARL - Technopole Montesquieu - 5 allée Jacques Latrille 33650 MARTILLAC - FRANCE. Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). Formulation : Micro-émulsion (ME). Type d'action du produit : insecticide, acaricide, fongicide (traitement des parties aériennes). Mode d'action : Dessiccant, agit par contact. Numéro de lot et date de fabrication : voir sur l'emballage.



ATTENTION

LIMOCIDE® J

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332 Nocif par inhalation.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation/utilisation. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P304+P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un organisme agréé.

SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

En cas d'urgence, appeler le 15 / 112 ou le centre antipoison.



SBM

Distribué par : SBM Life Science SAS  
60 chemin des Mouilles - 69130 Ecully - Tél. : 04 37 64 32 00

© Marque déposée par Vivagro

**Précautions d'emploi** : Lire l'étiquette avant emploi. Respecter les doses et les volumes de bouillies préconisées (ne pas surdoser ni aller jusqu'au ruissellement sur le feuillage). Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, ...). Attention : ce produit peut porter atteinte à la faune auxiliaire. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer à moins de 5 mètres d'un point d'eau (puits, bassin, mare, ruisseau, rivière, fossé...). Ne pas traiter un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits...en particulier si le terrain est en pente. Ne pas appliquer sur feuillage humide. Délai de rentrée : attendre le séchage complet de la zone traitée. Tenir hors de portée des animaux domestiques. Ne pas rejeter dans l'évier, le caniveau ou tout autre point d'eau les fonds de bidon non utilisés et les eaux de lavage du pulvérisateur. Ne pas stocker le produit dans un local où la température peut dépasser 30°C. Conserver le produit uniquement dans le récipient d'origine bien fermé à l'abri du gel dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Réemploi de l'emballage interdit. Ne pas jeter dans les poubelles ménagères, mais éliminer l'emballage avec ou sans produit en déchèterie ou par un organisme agréé.

## TABLEAU DES USAGES

| CULTURES CIBLES<br>(traitement des parties aériennes)                                                                                                                      | MALADIES /<br>RAVAGEURS                  | DOSES D'EMPLOI<br>AUTORISÉES<br>POUR 10 m <sup>2</sup> | STADES<br>D'APPLICATION                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ACTION FONGICIDE                                                                                                                                                           |                                          |                                                        |                                                                           |
| Cultures florales et plantes vertes                                                                                                                                        | Rouille(s)                               | 10 mL/L (10 mL/L')                                     | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la fin de floraison             |
| Rosier                                                                                                                                                                     | Oïdium(s)                                | 6 mL/L (6 mL/L')                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                            | Oïdium(s),<br>Maladies des tâches noires |                                                        |                                                                           |
| Arbres et Arbustes                                                                                                                                                         | Oïdium(s)                                |                                                        | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à ce que les fruits soient formés |
| Navet, Rutabaga, Radis, Choux-raves,                                                                                                                                       | Mildiou(s)                               | 3,2 mL/0,8 L (4 mL/L')                                 | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                      |
| Tomate, Aubergine, Physalis spp.,<br>Poire-melon, Poivron, Piment                                                                                                          |                                          | 4 mL/0,5 L (8 mL/L')                                   |                                                                           |
| Artichaut, Cardon                                                                                                                                                          |                                          | 3,2 mL/0,5 L (6,4 mL/L')                               | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la formation des fruits         |
| Laitue, Chicorée scarole, Chicorée frisée,<br>Mâche, Roquette et autres Salades,<br>Chicorées - production de racines                                                      | Mildiou(s),<br>Oïdium(s)                 | 3 mL/0,5 L (6 mL/L')                                   | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                      |
| Fines herbes (dont ciboule, ciboulette,<br>persil, cerfeuil, feuilles de fenouil,<br>angélique et carvi, basilic, thym)                                                    | Oïdium(s)                                | 2,4 mL/0,4 L (6 mL/L')                                 | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la fin de floraison             |
| Carotte, Céleri branche, Céleri rave,<br>Panais, Raifort, Topinambour, Persil à<br>grosse racine, Fenouil, Rhubarbe                                                        |                                          |                                                        | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la graine                       |
| Salsifis, Scorsonère                                                                                                                                                       |                                          | 3 mL/0,5 L (6 mL/L')                                   | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                      |
| Concombre et autres cucurbitacées à<br>peau comestible, Melon, Potiron,<br>Pastèque                                                                                        |                                          | 8 mL/L (8 mL/L')                                       |                                                                           |
| Cornichon, Courgette                                                                                                                                                       |                                          | 4 mL/0,5 L (8 mL/L')                                   |                                                                           |
| Choux (dont choux feuillus, choux à<br>inflorescence, choux pommés,<br>choux-raves)                                                                                        | Rouille(s)                               | 2 mL/0,5 L (4 mL/L')                                   |                                                                           |
| Framboisier, Mûres ( <i>Rubus</i> sp.), Mûres<br>des haies, Cassissier, Myrtilier,<br>Groseiller, Sureau noir, Mûre - <i>Morus</i> sp.<br>- airelle, Cynorhodon, Azérolier | Oïdium(s)                                | 2,4 mL/0,3 L (8 mL/L')                                 | Du développement des feuilles et jusqu'à la récolte                       |
| Fraisier                                                                                                                                                                   |                                          | 3 mL/0,5 L (6 mL/L')                                   | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                      |
| Pêcher, Abricotier, Nectarinier                                                                                                                                            |                                          | 6 mL/L (6 mL/L')                                       | Du développement des feuilles et jusqu'à la fin de floraison              |
| Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi,<br>Néflier, Pommette                                                                                                                  |                                          | 2,8 mL/0,7 L (4 mL/L')                                 |                                                                           |
| Vigne                                                                                                                                                                      | Mildiou(s),<br>Oïdium(s)                 | 1,6 mL/0,2 L (8 mL/L')                                 | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                      |
| Épices                                                                                                                                                                     | Maladies<br>fongiques                    | 2,4 mL/0,4 L (6 mL/L')                                 |                                                                           |
| ACTION INSECTICIDE ET ACARICIDE                                                                                                                                            |                                          |                                                        |                                                                           |
| Cultures florales et plantes vertes                                                                                                                                        | Cicadelles                               | 8 mL/L (8 mL/L')                                       | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à l'apparition de l'inflorescence |
|                                                                                                                                                                            | Thrips                                   |                                                        |                                                                           |
|                                                                                                                                                                            | Cochenilles                              |                                                        | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la maturité des fruits          |
|                                                                                                                                                                            | Pucerons                                 |                                                        | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la fin de la floraison          |
|                                                                                                                                                                            | Aleurodes                                |                                                        | 4 mL/L (4 mL/L')                                                          |
| Rosiers                                                                                                                                                                    | Pucerons, Thrips                         | 8 mL/L (8 mL/L')                                       | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la fin de la floraison          |
|                                                                                                                                                                            | Aleurodes                                | 4 mL/L (4 mL/L')                                       |                                                                           |

| CULTURES CIBLES<br>(traitement des parties aériennes)                                                                                                                                                       | MALADIES /<br>RAVAGEURS                 | DOSES D'EMPLOI<br>AUTORISÉES<br>POUR 10 m <sup>2</sup> | STADES<br>D'APPLICATION                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbres et Arbustes                                                                                                                                                                                          | Cicadelles                              | 8 mL/L (8 mL/L')                                       | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à l'apparition de l'inflorescence                 |
|                                                                                                                                                                                                             | Thrips                                  |                                                        | De la formation des fruits et jusqu'à la maturité des fruits                              |
|                                                                                                                                                                                                             | Cochenilles                             |                                                        | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la fin de la floraison                          |
|                                                                                                                                                                                                             | Pucerons                                |                                                        |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                             | Aleurodes                               | 4 mL/L (4 mL/L')                                       |                                                                                           |
| Haricot, Pois : Fève sèche, Haricot sec,<br>Pois sec, Pois chiche, Lentille sèche, Pois<br>écosés frais, Lentille fraîche, Pois sabre,<br>Flageolet, Fève, Lima, Niébé, Haricot et<br>Pois non écosés frais | Pucerons                                | 8 mL/L (8 mL/L')                                       | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                                      |
|                                                                                                                                                                                                             | Aleurodes                               | 4 mL/L (4 mL/L')                                       |                                                                                           |
| Cassissier, Groseiller, Myrtilier, Sureau<br>noir, Airelle, Cynorhodon, Azérolier                                                                                                                           | Cercopidés,<br>Cicadelles               | 2,4 mL/0,3 L (8 mL/L')                                 | A partir du début de la floraison et jusqu'à la récolte                                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Psylles                                 |                                                        |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                             | Acariens                                | 2 mL/0,2 L (10 mL/L')                                  |                                                                                           |
| Framboisier, Mûres ( <i>Rubus</i> sp.),<br>Mûres des haies                                                                                                                                                  | Acariens et<br>phytophages              | 2 mL/0,5 L (4 mL/L')                                   |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                             | Cicadelles,<br>Cercopidés et<br>Psylles | 2,4 mL/0,3 L (8 mL/L')                                 |                                                                                           |
| Vigne                                                                                                                                                                                                       | Acariens, Erinose                       | 2 mL/0,2 L (10 mL/L')                                  | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                                      |
|                                                                                                                                                                                                             | Cicadelle verte                         | 1,6 mL/0,2 L (8 mL/L')                                 |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                             |                                         | Thrips                                                 |                                                                                           |
| Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi                                                                                                                                                                         | Cicadelles,<br>Cercopidés               | 4 mL/0,5 L (8 mL/L')                                   | Jusqu'à la récolte                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                             | Psylles                                 | 2,8 mL/0,7 L (4 mL/L')                                 | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                                      |
| Agrumes                                                                                                                                                                                                     | Cochenilles                             | 8 mL/L (8 mL/L')                                       | A partir du développement des fruits et jusqu'à la récolte                                |
|                                                                                                                                                                                                             | Thrips                                  |                                                        |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                             | Cicadelles,<br>Psylles                  |                                                        | A partir du début de la floraison et jusqu'à la récolte                                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Aleurodes                               |                                                        |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                             | Acariens                                | 6 mL/L (6 mL/L')                                       |                                                                                           |
| Fraisier                                                                                                                                                                                                    | Thrips                                  | 4 mL/0,5 L (8 mL/L')                                   | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                                      |
| Kiwi                                                                                                                                                                                                        | Cicadelle                               | 8 mL/L (8 mL/L')                                       | Du début et jusqu'à la fin du grossissement des fruits                                    |
| Tomate, Aubergine, Physalis,<br>Poire-melon, Poivron, Piment                                                                                                                                                | Chenilles<br>phytophages                | 4 mL/0,5 L (8 mL/L')                                   | De l'ouverture de la première feuille de la troisième inflorescence et jusqu'à la récolte |
|                                                                                                                                                                                                             | Thrips                                  |                                                        | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                                      |
|                                                                                                                                                                                                             | Aleurodes                               | 2 mL/0,5 L (4 mL/L')                                   |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                             | Thrips                                  | 4 mL/0,5 L (8 mL/L')                                   |                                                                                           |
| Choux (Choux feuillus, Choux à<br>inflorescence, Choux pommés,<br>Choux-raves)                                                                                                                              | Aleurodes                               | 2 mL/0,5 L (4 mL/L')                                   |                                                                                           |
| Oignon, Oignon de printemps, Ail,<br>Ciboule, Echalotte, Poireau                                                                                                                                            | Thrips                                  | 3,2 mL/0,4 L (8 mL/L')                                 |                                                                                           |
| Cornichon, Courgette                                                                                                                                                                                        | Aleurodes                               | 2 mL/L (2 mL/L')                                       |                                                                                           |
| Concombre                                                                                                                                                                                                   |                                         | 4 mL/L (4 mL/L')                                       |                                                                                           |
| Courgette, Concombre, Cornichon,<br>Potiron, Melon, Pastèque                                                                                                                                                | Thrips                                  | 8 mL/L (8 mL/L')                                       | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la floraison                                    |
| Potiron, Melon, Pastèque                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                        |                                                                                           |
| Laitue, Chicorée scarole, Chicorée frisée,<br>Mâche, Roquette et autres Salades                                                                                                                             | Aleurodes                               | 2 mL/ 0,5 L (4 mL/L')                                  | Du stade de 2 feuilles étalées et jusqu'à la récolte                                      |

**Intervalle minimum entre deux applications** : 7 jours. **6 applications maximum par an sauf pour** : Vigne contre érinose : 2 par an; Petits fruits contre acarions (cassissier, framboisier, groseiller, mûres, myrtilier) : 2 par an; Courgettes contre aleurodes : 3 par an. **Délai avant récolte (DAR)** : 1 jour sauf pommier contre oidium : dernière application à la fin de la floraison, et vigne contre oidium et mildiou : dernière application à la fermeture de la grappe. **Zone non traitée aquatique** : 5 mètres.

\*Équivalent en mL/L de la dose d'emploi (pour traiter 10m<sup>2</sup> se référer à la dose autorisée).

SBM Info Conso  
0 800 02 03 04 Service à appel  
gratuit

UFI : C200-300W-Y00T-UD17

556714FRa